

01275

6084.

112

BULLETIN

DE

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES

DE


ST.-PÉTERSBOURG.



TOME TRENTE-DEUX.

(Avec 6 planches.)

32



ST.-PÉTERSBOURG, 1888.

Commissionaires de l'Académie Impériale des sciences:

A ST.-PÉTERSBOURG:
Eggers & C^{ie} et J. Glasounof;

A RIGA:
N. Kymmel;

A LEIPZIG:
Voss Sortiment (G. Haessel).

Prix du volume: 3 Roub. arg. pour la Russie, 10 marks allemands pour l'étranger.

tota longitudine dehiscenti aequilongis, stylo columnari corollam aequante; capsula in pedicello recto erecta ovoidea valvis dorso sulcatis, seminibus (quodam loculo abortu singulis) oblongis testa laxa minute eleganter reticulata.

Nippon: prov. Musaschi alpe Nikko (Savatier frf. admixta *A. cernuae* N° 2119, J. Matsumura sub nom. japon. Abura-tsutsusi, deflorescens fr. immat.).

Flore excepto persimilis *Enkyantho Meisteriae* (ob semina alata ad *Enkyanthum* ducto a Bentham et Hooker), qui olim *Andromeda cernua* Miq. et a nostra differt foliis latioribus, racemis subsessilibus rhachi communi 20—25 mm. longa fasciculatis, pedicellis 5—15 mm. longis, flore majore (7 mm. longo, in *A. nikoënsi* 5 q. exc. mm.), corollae apice non constrictae dentibus laciniatotridentatis erectis nec reflexis, filamentum antheraque totis breve hispidis, capsula 5—6 mm. alta in pedicello infracta, alis seminum longitudinalibus crispis, una tota longitudine seminis, reliquis abbreviatis numerosis. *E. japonicus* Hook. f. quoad corollam similis, sed corolla basi eximie quinquegibba, differt calycis partitionibus subulatolanceolatis, floribus fasciculatis subpraecocibus, stylo ovarioque conicis sensim altero in alterum abeuntibus.

Rhododendron ellipticum. (Sect. *Azaleastrum* Pl.) Arboreum adultum glabrum, foliis coriaceis per 2 annos persistentibus longiuscule (13—20 mm.) petiolatis concoloribus laeviusculis ellipticis subito apiculatis (60:22 usque 90:45 mm. magnis) ex gemma terminali linearilanceolata prodeuntibus; floribus in quavis gemma lanceolata imbricatomultiperculata 1—2 longe (25—30 mm.) pedicellatis amplis (diam. 6 cm.) pallide roseis, sepalis depressohemisphaericis v. ad merum marginem reductis, corollae rotatae partitionibus obovatooblongis, staminibus 10 inclusis filamentis basi dense paleaceotomentosis, stylo stamina superante versus stigma obconico germineque conicolineari 5-loculari glabris.

China australiore (Seniawin, flor.); archipelago *Ya-yama* inter *Liukiu* et *Formosam* (Tashiro, 1886 flor.)

Huic proximum est *Rh. ovatum* Pl., pro quo olim plantam Seniawini perperam sumpseram, quod vero 5-andrum microphyllum, ad pedicellos glandulosopilosum est et florem duplo saltem minorem habet.

Schizocodon rotundifolius. Caudice elongato fibroso, squamis subulatis membranaceis ad basin scapi paucis

atque in ipso scapo a medio sursum 3—5 summa calyci approximata, foliis longe petiolatis membranaceo-chartaceis opacis orbiculatis v. rotundatoovalibus basi brevissime secus petiolum decurrentibus v. intimis cuneatoobovatis omnibus obsolete truncatis atque circumcirca apiculatosinuatis scapum debilem 1-florum superantibus, sepalis oblongis acutis truncatisve conniventibus, corolla . . . , germine globoso, stylo columnari exserto persistente.

Archipelago *Ya-yama* (*Formosae* proximo) a. 1886 legit Tashiro fr. nond. mat.

Ad hoc genus neque ad *Shortiam* retuli ob styli naturam, ceterum *Shortia uniflora* foliis opacis tenuioribus et flore 1 magis congrua quam *Schizocodones* duo noti, qui floribus racemosis, foliis coriaceis lucidis squamisque ovatis coriaceis valde distant.

Folia maxima 73 mm. lata, 68 mm. longa, petiolus 90 mm. Scapus ascendens 8 cm. altus. Calyx 8 mm. longus.

Androsace L.

Species Asiae orientalis et centralis¹⁾.

- Annuae v. biennes, radice simpliciter tenui, rosula foliorum radicalium solitaria v. nulla. 2.
Perennes. 10.
2. Folia omnia caulina, umbellae axillares et terminalis. *A. crecta* m.
Rosula radicalis, scapi nudi umbella terminali. 3.
 3. Folia reniformicordata. 4.
» elliptica lanceolata v. linearilanceolata. 6.
 4. Lamina foliorum lobata v. fissalaciniis iterum crenatis v. lobatis, pedicelli breves, calycis lobi in fructu recurvi. *A. rotundifolia* Hardw.
Folia grandicrenata, pedicelli vulgo elongati. 5.
 5. Calyx fructifer stellatopatens laciniis lanceolatis, corolla calycem duplo saltem superans. *A. saxifragae-folia* Bge.
Calyx fructifer patulus laciniis deltoideis, corolla calyce vix longior. *A. Gmelini* Gaertn.
 6. Involucrifolia majuscula spathulata patentia, calyx fructifer auctus. *A. maxima* L.
Involucrum microphyllum, calyx tum vix v non auctus. 7.
 7. Folia coriacea dense ciliata spathulata cum apiculo, scapi plures, umbellae multiflorae, pedicelli elongati, flores caraei calyce 5-lobato, radix biennis. *A. Aizoon* Duby.
Folia herbacea, radix annua. 8.
 8. Calyx ad medium 5-fidus laciniis elongatodeltoideis acutis capsulam superans v. aequans, corolla calyce brevior. *A. elongata* L.

¹⁾ Exclusis arcticis *A. arctica* et *A. ochotensi*, de quibus nil novi habeo.