

6484.

03-57

MÉMOIRES

DE

L'ACADEMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG, VII^e SÉRIE,
TOME XVI, N° 9.

RHODODENDREAE

ASIAE ORIENTALIS.

N 5910.

SCRIPSIT

TABULISQUE 4 LAPIDI INCISIS ILLUSTRAVIT

C. J. Maximowicz,
socius Academiae.

Lu le 30 Juin 1870.



ST.-PÉTERSBOURG, 1870.

Commissionnaires de l'Académie Impériale des sciences:

à St.-Pétersbourg:

MM. Eggers et C^{ie}, H. Schmitzdorff, M. N. Kymmel; A. E. Kechribardshi; M. Léopold Voss.
J. Issakoff et A. Tscherkessoff;

à Riga:

à Odessa:

à Leipzig:

Prix: 80 Kop. = 27 Ngr.

Hab. in *China australiori*, loco speciali non adnotato (Seniavin plura specimina florentia collegit, in herb. Fisch. servata).

Videtur *Rh. Championae* Hook. ita fere affine ut *Rh. indicum* L. *Rh. ledifolio* Don., foliorum forma, reticulatione et magnitudine, tegmentis glutinosis, corollae conformatio- simile, pube non glandulosa densissima, floribus triplo minoribus, staminibus 5 exsertis, calyce brevissimo bene diversum. — Capsula adhuc ignota. Stigma 5-lobum.

Tab. 3. fig. 21. Specimen florens magnitudine naturali. 22. Pedunculus cum calyce, ovario et stylo. 23. Stamen, magnitudine ter auctum, ut praecedens. 24. Gemma terminalis, demum foliis fulcien- tibus, magnitudine naturali, ex alio specimine.

19. Rh. Oldhami n. sp. (*Tsusia*) totum setis longis mollissimis atque pube tenera breviore glandulosa badio-villosissimum, semperfurens; ramis elongatis debilibus a basi dense foliosis; foliis membranaceis breve petiolatis late ellipticis vel ovato-ellipticis utrinque acutis apice mucrone longiusculo glanduloso apiculatis, utrinque indistincte sub-5-costatis; floribus terminalibus subternis cum innovationibus ortis; pedunculo calycem 5-partitum laciniis lanceolatis longissime acuminatis aequante; corollae infundibuliformi-campanulatae tubo calycem vix superante; staminibus 10 corollam subaequantibus; antheris...; ovario glanduloso-setoso.

Hab. in insula *Formosa*, prope *Tamsuy* (Oldham! 1864. № 212, subdefl.).

Affine tantum *Rh. ledifolio* Don., sed pubescens, ramis longissimis debilibus foliosis foliorumque forma diversissimum. — *Rh. Championae* Hook. abhorret pube rigida uniformi breviore parciore, foliis coriaceis reticulatis, forma alienis, calyce, tegmentis viscosissimis.

Rami ultra pedales, novelli hirsutissimi. Folia $2\frac{1}{2}''$: $1\frac{1}{4}''$, petiolo 3-lineali, mucrone apicali 1 mill. longo. Corolla circa $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, ex sicco, ut videtur, coccinea vel purpurea, lobis ovalibus. Antherae desunt, floresque male exsiccati et conservati, ita ut ampliora non suppetant.

20. Rh. linearifolium Sieb.! et Zucc. Flor. Jap. fam. nat. II. p. 131. in Abh. Bayr. Akad. IV. Abth. III. — Miq. Prol. p. 97. — *Azalea linearifolia* Hook. in bot. mag. t. 5769. (nimis decora). Humile, semperfurens, verticillato-ramosum, totum pube rufa setosa hirsutissimum, ad pedunculos calycesque glanduloso-pilosum; foliis apice ramorum aggregatis petiolatis linearibus utrinque longe acuminatis acutissimis, indistincte brevissime utrinque sub-10-costatis; tegmentis subulatis cito caducis; floribus 1—3; pedunculo calycem 5-partitum laciniis linearisubulatis erectis aequante; corollae ad basin 5-partitae laciniis linearilanceolatis longe acuminatis patenti-recurvis calycem duplo superantibus; staminibus 5 stylo longioribus corollam vix aequantibus; ovario hispidissimo; capsula...

Hab. in *Japoniae* (Siebold! flor.) ins. *Nippon borealis* provincia *Sendai*, in alpibus, unde Yedo introductum et raritatis causa cultum (sterile, et autumno iterum florens habui), nec non *Kiusiu* prov. *Simabarae* vulcano *Wunzen*, undè Miaco et Nagasaki, nunc etiam